

Actueel WG van het middel LALSTOP G46 WG, 16694 N

1 mei 2024

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Spuiten, tijdens de bloei	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	2	21
Aardbei (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnels)	Spuiten, tijdens de bloei	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,3 kg/ha	4	6
Sla; <i>Lactuca</i> spp (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmels ²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten, druppelen of spuiten na verplanten	Zaad en bodemschimmels ²	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	3	21
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	2,5 kg/ha	1	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil, (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmel ³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmel ³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmel ³	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Bladvlekkenziekte ⁴	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Komkommer (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet- eetbare schil (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmel ³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmel ³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmel ³	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Bladvlekkenziekte ⁴	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Tomaat (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmel ³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmel ³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmel ³	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Paprika (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmels ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁵	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Aubergine (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmel ³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmel ³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmel ³	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	2,5 kg/ha	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmels ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁵	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Spuiten (aarde) na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 planten	4	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	2,5 kg/ha	1	-
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁵	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmel ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Spuiten (aarde) na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁵	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 planten	4	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Grauwe schimmel (*Botrytis* sp.)

² Zaad en bodemschimmels (*Pythium* spp. en *Rhizoctonia* spp.).

³ Zaad en bodemschimmel (*Pythium* spp.).

⁴ Bladvlekkenziekte (*Didymella* sp.).

⁵ Zaad en bodemschimmel (*Pythium* spp. en *Phytophthora* spp.).

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaam-heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Witlof (pennenteelt, bedekte teelt)	Gieten / dippen van wortels (na de oogst, voor opslag van de wortels).	Wortelrot ⁶	0,4 g per 1L water	0,4 g/L	1	-
	Spuiten van wortels (voor opslag)	Wortelrot ⁶	0,2-0,4 g per 1L water	0,4 g/L	1	-
Chicorei (bedekte teelt)	Gieten / dippen van wortels (na de oogst, voor opslag van de wortels).	Wortelrot ⁶	0,4 g per 1L water	0,4 g/L	1	-
	Spuiten van wortels (voor opslag)	Wortelrot ⁶	0,2-0,4 g per 1L water	0,4 g/L	1	-
Aardbei (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Dipbehandeling voor verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁷	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,15 kg/ha	1	-
	Gieten of spuiten (aarde) voor verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁷	12,5 g/1000 planten	12,5 g/1000 planten	1	-
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁷	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	2	28
Aardbei (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmel ⁸	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmel ⁸	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaam-heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmel ⁸	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	3	21
Aardbei (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnels)	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,12 kg/ha	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond tijdens of na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁹	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	2	21
Aalbes (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling tijdens de bloei	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3 - 0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	3	7
Blauwe bes (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnels)	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,02 kg/ha	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond tijdens of na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁹	25-40 g/1000 planten	40 g/1000 planten	2	21
	Gewasbehandeling tijdens de bloei	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3 - 0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	3	7
Veenbes (onbedekte teelt)	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1,25 kg/ha	1	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaam-heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Gieten, druppelen of spuiten op grond tijdens of na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3 - 0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	2	21
Braam (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnel)	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ⁷	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,05 kg/ha	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond tijdens of na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁷	25-30 g/1000 planten	30 g/1000 planten	2	21
Braam (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling, tijdens de bloei	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3-0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	3	7
Braam (walk-in tunnel)	Gewasbehandeling, tijdens de bloei	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,2-0,3 kg/ha	0,3 kg/ha	3	7
Framboos (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnel)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmel ⁸	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmel ⁸	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmel ⁸	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	3	21
	Dipbehandeling voor verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁷	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,15 kg/ha	1	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaam-heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Gieten of spuiten (grond) voor verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁷	12,5 g/1000 planten	12,5 g/1000 planten	1	-
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁷	25-30 g/1000 planten	30 g/1000 planten	2	28
	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Framboos (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnel)	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ⁷	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,05 kg/ha	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond tijdens of na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁷	25-30 g/1000 planten	30 g/1000 planten	2	21
Framboos (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling, tijdens de bloei	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3-0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	3	7
Framboos (walk-in tunnel)	Gewasbehandeling, tijdens de bloei	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,2-0,3 kg/ha	0,3 kg/ha	3	7
Bladgroenten (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaam-heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmels ¹⁰	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	3	21
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	2,5 kg/ha	1	-
	Gewasbehandeling na opkomst	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Bladgroenten (m.u.v. sla, bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmels ²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmels ²	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	3	21
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	2,5 kg/ha	1	-
Bladgroenten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling na opkomst	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3 - 0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	2	21
Boon met peul (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnels)	Gewasbehandeling na opkomst	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3 - 0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	2	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil, Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet- eetbare schil (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ⁸ , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmels ⁸ , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁸ , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
Augurk, Courgette (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnel)	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet- eetbare schil (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnel)	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Komkommer (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnel)	Gewasbehandeling na opkomst	Bladvlekkenziekte ⁴ Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,1 kg/ha	1	-
	Gewasbehandeling na verplanten	Bladvlekkenziekte ⁴ Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,3 kg/ha	2	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaam-heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
			0,2 - 0,3 kg/ha			
Augurk Courgette Meloen Watermeloen (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnel)	Gewasbehandeling tijdens of na planten / verplanten	Bladvlekkenziekte ⁴ Gauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,2 - 0,3 kg/ha	0,3 kg/ha	2	21
Aubergine (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Gewasbehandeling na verplanten	Bladvlekkenziekte ⁴	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ⁸ , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmels ⁸ , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁸ , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Gauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Koolgewassen (bedekte teelt, m.u.v walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Koolgewas-sen (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnels)	Spuiten op grond tijdens planten / verplanten	Knolvoet ¹¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 5 - 10 kg/ha	10 kg/ha (1 g/m ²)	1	-
	Spuiten op grond na verplanten	Knolvoet ¹¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3 - 0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	2	21
Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortel (onbedekte teelt)	Spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmel ⁸ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3 - 0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	2	21
Uien (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Dipbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,15 kg/ha	1	-
	Gieten of spuiten op grond (rijen) na opkomst	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,3 kg/ha	2	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Plantui, Zilverui, Picklers, Knoflook (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels):	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁹	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	3	21
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	2,5 kg/ha	1	-
Sjalotten, Knoflook (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Dipbehandeling tijdens verplanten	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,15 kg/ha	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)	Dipbehandeling (dompelbehandeling) voor of tijdens planten	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,15 kg/ha	1	-
	Gieten of spuiten op grond na planten (na een dompelbehandeling)	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3 - 0,4 kg/ha	0,4 kg/ha	1	21
Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (walk-in tunnels)	Gieten of spuiten op grond na planten (na een dompelbehandeling)	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,2 - 0,3 kg/ha	0,3 kg/ha	1	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Asperge, Bleekselderij, Kardoen, Knolvenkel Prei, Artisjok (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmels ⁹	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	3	21
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ⁹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	2,5 kg/ha	1	-
Asperge, Bleekselderij, Kardoen, Knolvenkel, Prei, Artisjok (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Dipbehandeling tijdens verplanten	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,15 kg/ha	1	-
	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Grauwe schimmel ¹ , Fusarium ¹²	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
Kruidenteelt (vers) (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaam-heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Gieten, druppelen of spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Gewasbehandeling na verplanten	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	1 kg/ha (0.1 g/m ²)	4	21
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ¹³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmels ¹³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmels ¹³	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmels ¹³	25-50 g/1000 planten	50 g/1000 planten	4	21
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ¹³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	2,5 kg/ha	1	-
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ¹³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten, druppelen of spuiten na opkomst	Zaad en bodemschimmels ¹³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	3	21
	Gieten of druppelen na verplanten	Zaad en bodemschimmels ¹³	20-25 g/1000 planten	25 g/1000 planten	4	21
	Spuiten op grond na verplanten	Zaad en bodemschimmels ¹³	25-50 g/1000 planten	50 g/1000 planten	4	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaam-heid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Dipbehandeling bewortelde stek (opkweek)	Zaad en bodemschimmels ¹³	0,05% (50 g middel per 100 L water)	2,5 kg/ha	1	-
Boomkwekerijgewasse n (bedekte teelt, m.u.v. walk-in tunnels)	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	5	28
	Spuiten na opkomst	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water)	0,5 kg/ha	5	21
Boomkwekerijgewasse n (onbedekte teelt, incl. walk-in tunnels)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ¹	0,05% (50 g middel per 100 L water) 0,3 - 0,5 kg/ha	0,5 kg/ha	5	21
	Mengen door substraat	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	50 g/1000 L substraat	1	-
	Gieten of spuiten op grond na opkomst	Zaad en bodemschimmels ² , Zaad en bodemschimmels ¹⁰	0,05% (50 g middel per 100 L water)	10 kg/ha (1 g/m ²)	5	28
Greens van golfterreinen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Zaad en bodemschimmel ³ , Zaad en bodemschimmels ¹³	0,1 - 0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	5	21

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Grauwe schimmel (*Botrytis* sp.)

² Zaad en bodemschimmels (*Pythium* spp. en *Rhizoctonia* spp.).

³ Zaad en bodemschimmel (*Pythium* spp.).

⁴ Bladvlekkenziekte (*Didymella* sp.)

⁶ Wortelrot (*Thielaviopsis basicola*)

⁷ Zaad en bodemschimmels (*Phytophthora* spp., *Fusarium* spp. en *Pythium* spp.).

⁸ Zaad en bodemschimmel (*Rhizoctonia* spp.).

⁹ Zaad en bodemschimmels (*Phytophthora* spp., *Pythium* spp. en *Rhizoctonia* spp.).

¹⁰ Zaad en bodemschimmels (*Fusarium* spp. en *Phytophthora* spp.).

¹¹ Knolvoet (*Plasmodiophora brassicae*).

¹² Fusarium (*Fusarium* spp.)

¹³ Zaad en bodemschimmels (*Fusarium* spp. en *Rhizoctonia* spp.).

Overige toepassingsvoorwaarden:

De spuitvloeistof constant roeren tijdens gebruik.

In de toepassing van mengen door substraat (alle teelten) het middel toepassen in 20 000 – 50 000 L water/ha.

In de toepassing van gieten of druppelen na verplanten (alle teelten) het middel toepassen in 1 600 – 2 000 L water/ha.

In de toepassing van gieten, druppelen of spuiten op grond na opkomst (alle teelten) het middel toepassen in 10 000 – 20 000 L water/ha.

In de toepassing van spuiten op grond na opkomst (Bloembol- en bloemknolgewassen, Bloemisterijgewassen) het middel toepassen in 20 000 – 50 000 L water/ha.

Bevat micro-organisme *Clonostachys rosea* J1446. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.