

WG van het middel Spruzit HP, 16831 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering middel* per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ , trips ²	0,6 – 1,2 L/ha**	1,2 L/ha	2 per 12 maanden	2,4 L/ha per 12 maanden	5
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Bladluizen ¹	0,6 – 1,2 L/ha**	1,2 L/ha	2 per teeltcyclus	2,4 L/ha per teeltcyclus	7
	Trips ²					5
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ , trips ²	0,6 – 1,2 L/ha**	1,2 L/ha	2 per 12 maanden	2,4 L/ha per 12 maanden	5
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Bladluizen ¹	0,6 – 1,2 L/ha**	1,2 L/ha	2 per teeltcyclus	2,4 L/ha per teeltcyclus	7
	Trips ²					5
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Bladluizen ¹ , trips ²	0,6 – 1,2 L/ha**	1,2 L/ha	2 per 12 maanden	2,4 L/ha per 12 maanden	5
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Bladluizen ¹	0,6 – 1,2 L/ha**	1,2 L/ha	2 per teeltcyclus	2,4 L/ha per teeltcyclus	7
	Trips ²					5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Dosering is afhankelijk van planthoogte; planten <50 cm 0,6 L middel/ha in 600-1200 L water/ha, planten tussen 50 en 125 cm 0,9 L middel/ha in 800-1600 L water/ha, planten groter dan 125 cm 1,2 L middel/ha in 1000-2000 L water/ha.

¹ Bladluizen (*Aphididae* spp).

² Trips (*Thripidae* spp) o.a. gestreepte kastrips (*Parthenothrips dracaenae*), Californische trips (*Frankliniella occidentalis*) en tabakstrips (*Thrips tabaci*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel niet toepassen in walk-in tunnels.

In onbedekte teelten uitsluitend toepassen met machinaal voortgetrokken apparatuur.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van bloemisterijgewassen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel in de teelt van bloemisterijgewassen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing in de teelt van bloemisterijgewassen op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 100 cm gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing van het middel niet toegestaan na half september.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit middel op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bijen en natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van bijen en natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met natuurlijke vijanden en bijen.

Resistentie management

Let op: Dit middel bevat als werkzame stof pyrethrinen. Pyrethrinen behoren tot de groep van "Sodium Channel modulators". De IRAC code is 3A. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.