

4 februari 2022

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Aardbei (bedekte teelt)	mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	2 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)	trips ¹ wittevlies ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil (bedekte teelt)	trips ¹ wittevlies ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per teeltcyclus	3	4 uur
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i>	trips ¹	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	trips ⁵	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Prei (onbedekte teelt)	trips ⁵	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Gerbera (bedekte teelt)	wittevlies ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	-

¹ Californische thrips (*Frankliniella occidentalis*)² Bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)³ Kaswittevlies (*Trialeurodes vaporariorum*)

⁴ Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

⁵Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

Het gebruik in de teelt van oliehoudende zaden, vezelgewassen, peulvruchten, lupine, veldboon, witlof, cichorei, graszodenteelt, kers, pruim, aardbei, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, vijg en kiwi, bladgroenten, boon met peul (bedekt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare en niet-eetbare schil (onbedekt), koolgewassen (bedekt), wortel- en knolgewassen, asperge, stengelgroenten (bedekt), kruidenteelt vers of gedroogd, gladiool (onbedekt), bolbloemen en knolbloemen (bedekt), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen (bedekt), vaste plantenteelt, veredelingsteelt en zaadteelt (bedekt) en “onbedekte teelt van veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap” is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Oliehoudende zaden	Gewasbehandeling	trips ⁵ , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Oliehoudende zaden	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Vezelgewassen	Gewasbehandeling	trips ⁵ , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Vezelgewassen	Grond behandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Peulvruchten	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Peulvruchten	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Lupine (peulvrucht)	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Veldboon (peulvrucht)	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Witlof (pennenteelt)	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Cichorei	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Graszodenteelt	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	-
Kers (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kers (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Pruim (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	vlinders ⁷	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Pruim (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	vlinders ⁷	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Kleinfruit	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ¹ , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Bessen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Bessen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , mijten ²	1,2 l/ha	1,2 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Druif (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Vijg (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kiwi (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kiwi (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,2 l/ha	1,2 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Kiwi	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Bladgroenten	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Boon met peul (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	9 per 12 maanden	7	4 uur
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	9 per 12 maanden	7	4 uur
Koolgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ⁶ , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Koolgewassen (bedekte teelt)	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Wortel- en knolgewassen	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Asperge	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Stengelgroenten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per teeltcyclus	3	4 uur
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Kruidenteelt vers of gedroogd	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Gladiool (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	-
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	-
Bloemisterijgewassen (grondgebonden bedekte teelt)	Grondbehandeling	tripspoppen ^{1,5}	10 l/ha	10 l/ha	2 per 12 maanden	7	-
Snijbloemen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	wittevlieg ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,25 l/ha	2 per 12 maanden	7	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Potplanten (bedekte teelt)	Aangietbehandeling	Kevers ⁸ , tripspoppen ^{1,5}	0,23 l/m ³	0,23 l/m ³	2 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	0,125% (0,125 l per 100 l water)	1,5 l/ha	3 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	3	-
Sierheesters (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	-
Heide soorten (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	-
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	-
Boomkwekerijgewassen, containerteelt	Aangietbehandeling	kevers ⁸	0,23 l/m ³	0,23 l/m ³	2 per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	0,125% (0,125 l per 100 l water)	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	7	-
Vaste plantenteelt	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	-
Vaste planten, containerteelt	Aangietbehandeling	kevers ⁸	0,23 l/m ³	0,23 l/m ³	2 per 12 maanden	7	-
Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	trips ^{1,4} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	-
Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)	Grondbehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Onbedekte teelt van: Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap	Gewasbehandeling	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	-
Onbedekte teelt van: Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap	Bodembehandeling	ritnaalden ⁹ , emelten ¹⁰	5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	

¹ Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

² Bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

³ Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

⁴ Tabakswittevlieg (*Bemisia tabaci*)

⁵ Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

⁶ Koolwittevlieg (*Aleyrodes proletella*)

⁷ Pruimenmot (*Cydia funebrana*)

⁸ Gegroefde lapsnuitkever / taxuskever (*Otiorhynchus sulcatus*)

⁹ Ritnaalden (*Agriotes obscurus*)

¹⁰ Emelten (*Tipulidae*)

Toepassingsvoorwaarden

Let op: voor het gereed maken van de spuitvloeistof gelden speciale instructies, raadpleeg hiervoor de aanbevelingen van de fabrikant.

Bij toepassing via grondbehandeling het middel toepassen in 300-400 liter water per hectare.

Bij toepassing als gewasbehandeling het middel toepassen in de volgende spuitvolumes:

In de onbedekte teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare en niet eetbare schil het middel toepassen in 300-1500 liter water per hectare

In de teelt van ui-achtigen en prei het middel toepassen in 200-1500 liter water per ha.

In de teelt van aardbei (onbedekte teelt) het middel toepassen in 300-1600 liter water per ha.

In de teelt van bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare en niet eetbare schil (onbedekte teelt), bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt) het middel toepassen in 300-1500 liter water per ha.

In de teelt van bessen, druif en braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt) het middel toepassen in 400-1200 liter water per ha.

In de teelt van boomkwekerijgewassen het middel toepassen in 300-1200 Liter water per ha.

In de onbedekte teelt van sierheesters, heide soorten, bos en haagplantsoen en vruchtbomen en struiken het middel toepassen in een watervolume van 200-1000 liter per hectare.

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden bij gebruik in bedekte teelten. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

De gewasveiligheid van dit middel in de wintermaanden is voor de bedekte teelten van aardbei, vruchtgroenten van cucurbitaceae met en zonder eetbare schil, vruchtgroenten van solanaceae en gerbera niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat dit middel in de bedekte teelt van deze gewassen op grote schaal toegepast wordt.