

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 november 2011 tot uitbreiding van de toelating van het middel Rizolex vloeibaar, toelatingnummer 11098 N (W4)

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

- a. In de bedekte teelten van sla (inclusief veldsla), mits niet later toegepast dan één week na het uitplanten;
- b. Op plantenbedden van spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, boerenkool, Chinese kool en koolrabi, toegepast door middel van een grondbehandeling bij het zaaien;
- c. In de teelt van bloembollen, -knollen en bolbloemen toegepast door middel van een grondbehandeling;
- d. In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen.

Veiligheidstermijnen

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

4 weken voor sla en veldsla gedurende de periode van 1 maart tot 1 november;

8 weken voor sla en veldsla gedurende de periode van 1 november tot 1 maart.

Om in het water levende organismen te beschermen is - in de onbedekte teelt van bloembollen, -knollen en bolbloemen - bespuiting op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een beddenfrees in combinatie met minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Het gebruik in de bedekte teelt van veldsla is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd.

Bedekte teelten van sla (inclusief veldsla), ter bestrijding van *Rhizoctonia solani*.

Toepassen tot een week na het uitplanten.

Dosering: 0,4 ml middel per m² (40 ml per are).

Hoeveelheid water: tenminste 10 liter per are.

N.B.:

Het middel is onvoldoende werkzaam tegen *Sclerotinia*, *Botrytis* en *Pythium*. In het begin van de groeiperiode kan een lichte groeiremming optreden.

Bedekte plantenbedden van spruitkool, rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, boerenkool, Chinese kool en koolrabi, ter bestrijding van *Rhizoctonia solani* (zwartpoten).

Het middel vlak voor het zaaien over de grond verspuiten.

Dosering: 0,4 ml middel per m².



Bedekte teelt van bloembollen, -knollen en bolbloemen ter bestrijding van *Rhizoctonia solani* en *Rhizoctonia tuliparum* bij tulpen, irissen en diverse andere bolgewassen.

De potgrond die als dekgrond wordt gebruikt kan behandeld worden door het middel voor het gebruik gelijkmatig door de grond te mengen.

Dosering: 100 ml middel per m³ potgrond.

Onbedekte teelt van bloembollen, -knollen en bolbloemen, ter bestrijding van *Rhizoctonia solani* bij tulpen, irissen en diverse andere bolgewassen.

Het middel volvelds verspuiten en tenminste 10 cm diep inwerken met behulp van een frees.

Dosering: 2 ml per m².

Bedekte teelt van bloemisterijgewassen (snijbloemen), grondbehandeling vóór het planten, ter bestrijding van *Rhizoctonia solani*.

In de bedekte teelt vóór het planten middels een aangietbehandeling.

Dosering: 3,2 ml middel per m²

N.B.:

Wanneer Rizolex vloeibaar wordt gebruikt in de voor bloemisterijgewassen benodigde dosering (3,2 ml middel per m²) dan kunnen, in verband met de kans op smaakafwijkingen, geen groentegewassen als tussen- of vervanggewas worden verbouwd.

Bloemisterijgewassen (potplanten), ter bestrijding van *Rhizoctonia solani*

Potgrondbehandeling

Het middel over de te behandelen potgrond spuiten en zo gelijkmatig mogelijk door de grond mengen.

Dosering: 250 ml middel in 10 liter water per m³ potgrond.

Aangietbehandeling

Voor of tijdens de teelt per pot een aangietbehandeling uitvoeren.

Dosering: 0,1% (100 ml middel per 100 liter water).

Hiervan 100 ml per pot van ca. 10 cm diameter geven.

N.B.:

Het verdient aanbeveling om proefsgewijs vast te stellen of een plantensoort of variëteit het middel verdraagt.

Niet toepassen bij Anthurium en Poinsettia.

Bij Begonia, Cyclamen en Fuchsia is kans op enige schade niet uitgesloten.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is).

Gevoeligheid gewassen

Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde gewassen is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onder zoeken.

De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor de gewasveiligheid te kunnen nemen.