

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 6 februari 2015 tot afgeleide toelating van het middel Abir, toelatingnummer 14748 N

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling:

1. in de bedekte teelt van augurken, courgettes, komkommers en tomaten
2. in de bedekte teelt van rozen
3. in de bedekte teelt van gerbera.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

- 1 dag voor augurken, courgettes en komkommers
- 3 dagen voor tomaten

Om het risico voor resistentie te minimaliseren mag u dit product of andere producten die bupirimaat bevatten niet vaker gebruiken dan maximaal 6 maal per teeltseizoen, toe te passen in 2 blokken van maximaal 3 behandelingen per blok.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Het gebruik in de teelt van gerbera onder glas is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Hiervoor worden geen gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit beoordeeld. Het gebruik van dit middel in deze teelten geschiedt daarom voor eigen risico van de teler.

Augurken, courgettes, komkommers en tomaten, ter bestrijding van echte meeldauw (*Erysiphe* spp.)

Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Het middel in blokken van maximaal drie opeenvolgende behandelingen toepassen met een interval van 7 tot 10 dagen. Per teelt maximaal 6 behandelingen (2 blokken van 3 behandelingen) met Abir uitvoeren.

Tussen de blokken behandelingen uitvoeren met een middel met een ander werkingsmechanisme dat is toegelaten voor de meeldauwbestrijding in augurken, courgettes, komkommers en tomaten.

Dosering: 0,2% (200 ml per 100 liter water).

N.B. Onder lichtarme omstandigheden (herfst, winter en vroege voorjaar) en bij jonge gewassen in het vroege voorjaar is bij herhaalde optreden van afwijkingen aan de bladeren mogelijk.

Rozen onder glas, ter bestrijding van meeldauw (*Spaerotheca pannosa*)

Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Het middel in blokken van maximaal drie opeenvolgende behandelingen toepassen met een interval van 7 tot 10 dagen. Per kalenderjaar maximaal 6 behandelingen (2 blokken van 3 behandelingen) met Abir uitvoeren. Tussen de blokken behandelingen uitvoeren met een middel met een ander werkingsmechanisme dat is toegelaten voor de meeldauwbestrijding in rozen onder glas.

Dosering: 0,2% (200 ml per 100 liter water). Voeg steeds 0,1% (100 ml per 100 liter water) uitvloeier toe aan de spuitvloeistof.

N.B. Onder lichtarme omstandigheden (herfst, winter en vroege voorjaar) bleken de cultivars Baccara, Carina en Sonia gevoelig te zijn voor een behandeling met Abir; hierdoor werd een afwijking aan de bladeren waargenomen.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het toepassen van bestrijdingsmiddelen in de sierteelt dienen in acht te worden genomen.

Bij twijfel over fytotoxiciteit wordt aangeraden eerst op kleine schaal een proefbespuiting uit te voeren.

Gerbera onder glas, ter bestrijding van echte meeldauw (*Oidium citrulli*)

Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Het middel in blokken van maximaal drie opeenvolgende behandelingen toepassen met een interval van 7 tot 10 dagen. Per kalenderjaar maximaal 6 behandelingen (2 blokken van 3 behandelingen) met Abir uitvoeren. Tussen de blokken behandelingen uitvoeren met een middel met een ander werkingsmechanisme dat is toegelaten voor de meeldauwbestrijding in Gerbera onder glas.

Dosering: 0,15% (150 ml per 100 liter water). Voeg steeds 0,1% (100 ml per 100 liter water) uitvloeier toe aan de spuitvloeistof.